

КУЛЬТУРА СЕМЕННЫЕ ПОДВОИ ЯБЛОНИ

Подвой: **ЯБЛОНЯ ЛЕСНАЯ (интродукция)**

Заявитель: РУП «Институт плодководства» (Республика Беларусь)

Год включения сорта в Государственный реестр: 2003

Морфологические признаки:

Сеянцы сильные, от слабоветвящихся до ветвящихся, толстые, прямые, дугообразные, округлые, граненые в сечении, коричнево-буро-зеленой окраски, голые или опушенные. Чечевички среднего размера. Почки отогнутые, гладкие, опушенные. Листья крупные, удлинённой, округло-яйцевидной формы, коротко или длиннозаостренные, зеленые, с различными оттенками, от гладких до гофрированных, матовые или блестящие. Пластинка листа неопушенная. Край листа от мелкопильчатого до крупнопильчатого-городчатого. Черешок средней длины и толщины. Прилистники удлинённые.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Устойчивость подвоя к морозам высокая. Приживаемость – 95%, из них пригодных к окулировке – 97%. Приживаемость глазков (по осенней ревизии) – 99%, перезимовало – 95%. Устойчив к болезням. Отрицательные свойства: сеянцы имеют стержневую систему, поэтому требуют подрезки или пикировки.

Подвой: **АНТОНОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ (интродукция)**

Заявитель: РУП «Институт плодководства» (Республика Беларусь)

Год включения сорта в Государственный реестр: 2003

Морфологические признаки:

Сеянцы сильные, от ветвящихся до слабоветвящихся, толстые, прямые, округлые, граненые в сечении, коричнево-буро-зеленой окраски, голые или опушенные. Чечевички среднего размера. Почки отогнутые, гладкие, опушенные. Листья крупные, удлинённые, округло-яйцевидной формы, короткозаостренные, от светло-зеленых до темно-зеленых с сизо-желтоватым оттенком, от гладких до гофрированных, от матовых до блестящих. Пластинка листа среднеопушенная снизу. Край листа от городчатого до пильчатого-городчатого. Черешок средней длины и толщины. Прилистники удлинённые.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Подвой устойчив к низким температурам. Приживаемость подвоев от числа высаженных 99%. Из них подошло к окулировке – 99%. Приживаемость глазков (по осенней ревизии) – 99,6%, перезимовало – 94,6%. Сеянцы образуют разветвленную корневую систему. Привитые на нем сорта сильнорослые, в плодоношение вступают на 4-5-ый год после посадки в сад, совместим со всеми сортами яблони.