

КУЛЬТУРА: ВИШНЯ

Сорт: ЖЫВИЦА

Авторы: Э.Сюбарова, Р.Сулимова, М.Вышинская, В.Жук

Происхождение: получен методом скрещивания сортов

(Гриот остгеймский х Денисена желтая)

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005

Морфологические признаки:

Дерево среднерослое, с шаровидной, средней густоты кроной. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, бурая. Побеги средние, прямые, коричнево-бурой окраски. Чечевички средние, желтые. Листья крупные, широкие, обратно-яйцевидные, коротко-заостренные, темно-зеленой окраски, блестящие. Пластинка листа вогнутая (лодочкой), верхушка листа коротко-заостренная, основание-округлое, опушенность отсутствует. Край листа мелкопильчатый. Прилистники средние, ранопадающие. Черешок короткий, пигментированный. Железки мелкие, 1-2 шт. Соцветие зонтик, состоящий из двойных или тройных цветков. Цветки средние, белые. Плоды средние, одномерные, округлой формы. Высота плода 18,1 мм, диаметр 18,4 мм. Вершина плода округлая. Основание плода с углублением, брюшной шов мелкий, малозаметный. Плодоножка короткая, отделение от ветви хорошее, прикрепление к косточке непрочное. Окраска плода основная и покровная – темно-красная. Мякоть темно-красная, нежная, сочная. Косточка мелкая, яйцевидная, хорошо отделяется от мякоти.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Сорт раннего срока созревания. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к коккомикозу, не поражается монилиальным ожогом. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки в сад на семенном подвое. Самобесплодный. В качестве опылителей лучше использовать: Сеянец №1, Новодворская, Вянок. Плодоношение регулярное. Средняя урожайность составила 102 ц/га. Средняя масса плода 3,7 г. Дегустационная оценка 4,8 балла. Календарные сроки съема плодов первая декада июля. В плодах содержится: сухих веществ 13,9%, сахаров 8,7%. Плоды универсального назначения.