## КУЛЬТУРА: ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

Copt: **FPETA** 

Авторы: Л.Кухарева, С.Лобан

Происхождение:получен методом индивидуально-семейственного отбора

из дикорастущих популяций

Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

Год включения сорта в Государственный реестр: 2002

## Морфологические признаки:

Растение полусомкнутого типа. Стебель прямостоячий, четырехгранный, опушенный, красноватый, хорошо разветвленный, высотой 65-70 см. Ветви прямые, располагаются под тупым углом к стеблю. Высота прикрепления нижних ветвей 10 см. Среднее количество ветвей 1-го порядка до 40 шт. Листья черешковые, продолговато-яйцевидной формы, заостренные, цельные. опушения. Поверхность листовой пластинки морщинистая. Длина листовой пластинки 3 см, ширина 2 см. Соцветие – метелка, длиной до 2,5 см, количество соцветий на одном растении до 40 шт. Цветки мелкие, многочисленные, от бледно-розовой до бордовой окраски. Плод орешек, темно-коричневой окраски, овальной формы.

## Хозяйственно-биологическая характеристика:

Сорт не требователен к почве, однако на тяжелых глинистых почвах растет плохо. Предпочитает открытые места. Хорошо зимует и в начале апреля начинает вегетацию. Цветет в июне-июле, начиная со второго года жизни. Семена созревают в августе. Вегетационный период в среднем 175 дней. Средняя урожайность зеленой массы 187 ц/га, максимальная 205 ц/га. Используется в фармацевтической, парфюмерно-косметической промышленности, кулинарии.