

КУЛЬТУРА: **КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ**

Сорт: **ФОНАРИК**

Авторы: Е. Орленок, А. Чаховский

Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007

Морфологические признаки:

Листопадный кустарник до 1,15 м высоты. Крона густоветвистая, почти шаровидная. Ветви покрыты буровато-серой, шелушащейся корой. Молодые побеги коричневые, шелковисто-опушенные. Листья перистые, состоящие из 5 (3-7) продолговато-яйцевидных листочков, сверху зеленые, негусто опушенные, снизу шелковистые. Цветки золотисто-желтые, с 5-ю округлыми лепестками, до 2,5 см в диаметре, в небольших щитковидных соцветиях, расположенных на концах веточек текущего года.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Сорт обладает высокой побегообразовательной способностью. Светолюбив, в тени кусты становятся редкими и слабо цветут. Цветет с конца мая и до октября. В первой половине лета цветение более обильное. Требует регулярной обрезки, при которой удаляют поврежденные и отмирающие ветви. Может использоваться в групповых посадках, среди камней и в качестве живых изгородей.

Сорт: **РУМЯНЕЦ**

Авторы: Е. Орленок, Н. Дишук

Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007

Морфологические признаки:

Листопадный кустарник, чуть выше 1,0 м высоты. В первый год имеет стелющуюся форму, затем образует прямостоячие побеги. Взрослые растения со слегка раскидистой формой кроны, диаметром около 60 см. Побеги красновато-коричневые, опушенные. Листья 5-ти лопастные, до 2 см длины и 2,2 см ширины, сверху голые, снизу с редкими волосками. Цветки розовые, к концу цветения бледнеют, полумахровые 2,5-3,0 см в диаметре, расположены на концах молодых побегов одиночно или по 3-5 в щитковидных соцветиях.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Сорт предпочитает нейтральную, богатую питательными веществами, свежую почву. Легко размножается зелеными и одревесневшими черенками. Пересадку лучше переносит в молодом возрасте. В засушливые периоды необходим полив. Зимостойкость растений высокая. В первый год имеет стелющуюся форму, затем образует прямостоячие побеги. Цветет с начала июня и до конца августа. Семена созревают в конце сентября. Может использоваться в групповых посадках, среди камней и в качестве живых изгородей.