

КУЛЬТУРА: СЕЛЬДЕРЕЙ

Сорт: **АНИТА**

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма
«Satimex Quedlinburg Handelsgen mbH» (Германия)

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999

Морфологические признаки:

Растение высокое. Лист полуприподнятый. Корнеплод от малого до среднего; мякоть белая; отношение высоты к ширине средняя.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Позднеспелый, вегетационный период от появления всходов 175-185 дней. Товарная урожайность корнеплодов за 1996-1998 годы составила 534-766 ц/га. Масса корнеплодов - 460-600 г. Вкусовые качества хорошие. Корнеплоды хорошо хранятся, пригодны для потребления в свежем виде и переработки. Как позднеспелый сорт выращивается через рассаду. Семена сеют в конце февраля – начале марта. Высадка рассады в мае, плотность 5-7 растений на 1 м². Относительно устойчив к септориозу.

Сорт: **ЧЕРНОМОР**

Авторы: Т.Плеханова, М.Лавренюк, П.Миронюк, М.Ефимов

Заявитель: Сквирская селекционно-опытная станция овощеводства
(Украина)

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999

Морфологические признаки:

Растение высокое, полустоячего типа. Лист темно-зеленый, блестящий, гладкий без опушения, двоякоперисторассеченный; листовые дольки округло-клиновидные без опушения; черешки без опушения, сверху с бороздками, снизу слаборебристые с антоциановой окраской. Соцветие ложный зонтик. Цветы мелкие, белой окраски. Семена мелкие, светло-коричневые, удлинено-овальные с пятью ребрами. Корнеплод серовато-белый, округлый, гладкий с бороздками от черешков; головка корнеплода плоская, зеленовато-белая; мякоть белая с желтыми пятнами. Семенник прямостоячий, сильноразветвленный внизу.

Хозяйственно-биологическая характеристика:

Позднеспелый, вегетационный период от появления всходов 162-185 дней. Товарная урожайность корнеплодов за 1996-1998 годы составила

544-832 ц/га. Масса корнеплодов - 470-660 г. Вкусовые качества хорошие. Корнеплоды хорошо хранятся. Корнеплоды пригодны для потребления в свежем виде и для переработки. Как позднеспелый сорт выращивается через рассаду. Семена сеют в конце февраля – начале марта. Высадка рассады в мае, плотность 5-7 растений на 1 м². Устойчив к септориозу.