

СОРГО ЗЕРНОВОЕ НА ЗЕРНО

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность	Отклонение от средней урожайности по опыту		Масса 1000 семян	Натура зерна	Устойчивость к полеганию	Устойчивость к засухе	Вегетационный период
	2022	2023	2024	ц/га	ц/га	%	г	г	балл	балл	дни

ГСХУ "КОБРИНСКАЯ СС"

СРЕДНЕЕ ПО ОПЫТУ	0,0	0,0	39,0	13,0			22,6	626	5,0		128
КРИНИЧНОЕ	0,0	0,0	31,5	10,5	-2,5	-19,2	27,3	641	5,0		129
ЖАМЧУЖНАЕ			46,5	46,5	7,5	19,2	17,8	611	5,0		127
Критерий оценки	0,0	0,0	5,5								

ГСХУ "ЛЕПЕЛЬСКАЯ СС"

СРЕДНЕЕ ПО ОПЫТУ	0,0	43,4	28,9	24,1			26,8	491	5,0		121
КРИНИЧНОЕ	0,0	43,4	30,7	24,7	0,6	2,5	30,0	499	5,0		120
ЖАМЧУЖНАЕ			27,1	27,1	-1,8	-6,2	23,5	483	5,0		122
Критерий оценки	0,0	0,0	1,3								

ГСХУ "МОЗЫРСКАЯ СС"

СРЕДНЕЕ ПО ОПЫТУ	0,0	35,6	43,6	26,4			26,0	598	5,0	4,0	130
КРИНИЧНОЕ	0,0	35,6	48,7	28,1	1,7	6,4	27,5	600	5,0	4,0	130
ЖАМЧУЖНАЕ			38,3	38,3	-5,3	-12,2	24,2	596	5,0	4,0	130
Критерий оценки	0,0	0,0	1,9								

ГСХУ "ЖИРОВИЧСКАЯ СС"

СРЕДНЕЕ ПО ОПЫТУ	0,0	42,6	38,6	27,1			23,5	770	5,0		130
КРИНИЧНОЕ	0,0	42,6	41,3	28,0	0,9	3,3	23,4	773	5,0		130
ЖАМЧУЖНАЕ			35,9	35,9	-2,7	-7,0	23,5	767	5,0		129
Критерий оценки	0,0	0,0	1,9								

ГСХУ "НЕСВИЖСКАЯ СС"

СРЕДНЕЕ ПО ОПЫТУ	0,0	0,0	29,5	9,8			29,4	712	5,0	5,0	107
КРИНИЧНОЕ	0,0	0,0	34,7	11,6	1,8	18,4	29,8	738	5,0	5,0	105
ЖАМЧУЖНАЕ			24,4	24,4	-5,1	-17,3	28,9	685	5,0	5,0	108
Критерий оценки	0,0	0,0	2,9								

ГСХУ "ГОРЕЦКАЯ СС"

СРЕДНЕЕ ПО ОПЫТУ											
КРИНИЧНОЕ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
ЖАМЧУЖНАЕ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Критерий оценки	0,0	0,0	0,0								

СОРГО ЗЕРНОВОЕ НА ЗЕРНО

Наименование сорта	Урожайность по годам, ц/га			Средняя урожайность	Отклонение от средней урожайности по опыту		Масса 1000 семян	Натура зерна	Устойчивость к полеганию	Устойчивость к засухе	Вегетационный период
	2022	2023	2024	ц/га	ц/га	%	г	г	балл	балл	дни

Примечание: На ГСХУ "Горецкая СС" сорт Криничное не вызрел, остановка в росте и развитии произошла после фазы молочной спелости, развитие растений остановилось и уборка не проводилась. У сорта Жамчужное сильная изреженность растений по причине низкой силы роста. В следствии образования почвенной корки наблюдалась низкая всхожесть.